



Preparazione del paziente alla Stadiazione della Sindrome Brachicefalica

Nelle due settimane antecedenti alla procedura occorre applicare una pomata Elastopad (prodotto specifico per cani) sulle narici al fine di migliorare l'esito della chirurgia e la conseguente cicatrizzazione. È opportuno che il paziente abbia esami del sangue e delle urine recenti (non superiori ad un mese) e che sia disponibile tutta la cartella clinica al momento della visita.

Il giorno della procedura il paziente deve essere a digiuno da cibo da almeno 12 h lasciando acqua a disposizione fino a due ore prima della valutazione. Qualora il paziente presenti diarrea, feci malformate, perdita di peso è consigliabile eseguire una dieta specifica per i 3 giorni antecedenti all'esame somministrando solo carne bianca (tipo tacchino) o solo pesce (merluzzo) da bollire o scottare in padella. Questo consentirà di poter esplorare anche il colon qualora il medico lo ritenga opportuno.

La stadiazione e la chirurgia della Sindrome Brachicefalica è eseguita in regime di day hospital con tempi di dimissione del paziente che variano a seconda delle condizioni cliniche post chirurgiche. Raramente è prevista l'ospedalizzazione del paziente che comunque può essere richiesta nel caso in cui vi siano indicazioni mediche.

Al momento delle dimissioni verranno fornite le indicazioni relative alla gestione post chirurgica del paziente e alla eventuale terapia da somministrare.